ROSA CLINOPHYLLA.

R. (a) Germinibus globasis, caule pedunculisque sericeo-villosis; petiolis glandulosis villosis subaculeatis; stipulis fimbriatis; foliolis 9-11, oblongo-ellipticis duplicuso-servatis, supra lucidis subtus tomentasis; aculeis caulinis rectis geminatis. (N.)

ROSIER A FEUILLES PENCHÉES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, lisse, sarmenteux, ne paraît pas s'élever à plus de trois ou quatre pieds. Ses tiges, couvertes d'un duvet court, serré, blanchâtre, soyeux, sont armées çà-et-là, mais sur-tout à la base des stipules des feuilles, d'aiguillons tins, droits et géminés. Ses teuilles sont alternes, et penchées d'une manière très-remarquable. Les folioles, au nombre de neuf, souvent de onze, elliptiques, presque toujours doublement dentées, d'un vert gai, luisantes en-dessus, tomenteuses en-dessous, sont supportées par des pétioles velus, glanduleux, quelquefois munis de deux ou trois aiguillons petits et crochus. Les stipules sont frangées, à divisions

(1) CAULES fruticosus sericeo-villosus. RANT teretes villosi. Aculles stipulares duo. Folia alterna, pionata, propendencia, Foliala opposita, subsessilia oblongo-elliptica duplicato-serrata, supra hiesda, subminista. Privola glandulosi, villosi, subsenidenti, aculeis, a. 3, recurvis, minimos. Stipular limentes, firabilata, acuminata. Prouncula supius solitarii, aliquando genini, etiam terni, brevissimi, villosi. General globosum, villosima, folia floralidos alternis bracieisque nonnunquem subobsitum. Lobi Calicis indivisi, acuminati, sericeo-villosi. Privala 5, alba, obcordata, basi flavescentia. Faucius subglobosus. Maturum non vidi. (N.

